令和８年３月作成

令和8年度　仙台市 HIV（エイズ）・性感染症検査

最新の検査日程等は仙台市ホームページよりご確認いただくか、下記お問合せ先にお尋ねください。

青葉区役所　管理課　　022-225-7211 内線 6716
宮城野区役所　管理課　022-291-2111 内線 6719
若林区役所　管理課　　022-282-1111 内線 6728
太白区役所　管理課　　022-247-1111 内線 6715
泉区役所　管理課　　022-372-3111 内線 6716
感染症対策課　　022-214-8029

詳しくはWebで　エイズ検査　仙台市　検索

検査会場				検査日（原則）	受付時間	HIV・梅毒	性器クラミジア	予約・キャンセル方法
有料・記名	市内協力医療機関			各診療時間内		○	○ ※医療機関による	予約は２ステップです ①　仙台市ホームページから電子申請（24 時間受付）し、予約番号を取得 ②　検査を希望する医療機関に電話して検査日を予約 【キャンセル方法】 予約をした医療機関へ直接連絡
	※有料（1,000 円）・記名の検査です。ご注意ください。 ※協力医療機関や検査方法等、詳しくは仙台市ホームページよりご確認ください。							
無料・匿名	即日検査	休日検査	健康相談所　興生館	第１土曜日	13:30～15:00	○（結果は約１時間後）	×	予約方法は2種類です ●仙台市ホームページから電子申請（24 時間受付） ●予約専用電話 090－4478－4641 （平日 13 時～16 時） 【キャンセル方法】 電子申請の場合は「申し込み状況確認ページ」からキャンセル、電話の場合は検査予約専用電話番号（090-4478-4641）に電話もしくはショートメールで「検査日・予約番号・取消」と記入し送信
		夜間検査	●（R8.4 月～6 月）健康相談所　興生館 ●（7 月～R9.3 月）AER（アエル）6F	第 2・4 金曜日（祝日除く）	17:00～19:00			
	通常検査	平日日中検査	青葉区役所 2F	指定する火曜日	①9:30～11:00 ②13:30～15:00	○（結果は後日再来所）	×	予約方法は2種類です ●各区役所ホームページから電子申請（24 時間受付） ●各検査会場の管理課へ電話予約（平日のみ受付） 【キャンセル方法】 電子申請の場合は「申し込み状況確認ページ」からキャンセル、電話予約の場合は各会場へ電話
			宮城野区役所 3F	指定する火曜日	9:00～10:30			
			若林区役所 3F	指定する水曜日	9:30～11:00			
			太白区役所 3F	指定する火曜日	13:30～15:30			
			～R8.12 月　泉区役所　東庁舎２階 R9.1 月～　泉区役所３階	指定する月曜日	14:00～15:30			

【予約受付期間】
・有料・記名検査（医療機関検査）：令和9年３月まで。
・無料・匿名検査：原則、検査の２週間前の同じ曜日～検査前日　まで（先着順。キャンセルが出た分は随時受付再開）。
※検査当日は、受付の際に予約番号が必要です。予約の際に必ず番号をお控えください。

【注意事項】
・「即日検査」は、採血の約１時間後に結果をお伝えしますが、混雑状況により１時間以上かかる場合もございます。
・「通常検査」は、結果説明のために後日（概ね１週間後）ご本人に再来所していただきます。
・いずれの会場も HIV と梅毒は同時検査であり、どちらか一方のみの検査はできません。
・過去に梅毒の治療歴がある場合は、一般的に梅毒即日検査では陽性と判定されます。
・その他、注意事項については仙台市ホームページをご確認ください。

HIV/エイズ・性感染症の知識

感染を予防するアドバイス

これだけは守りましょう

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

1 性行為（精液・膣分泌液）

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

★ **性交・オーラルセックス（口腔性交）の際は、必ずコンドームを使う**

★ **性器具の共用をしない**

2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

★ **注射器具の共用をしない**

3 母親から赤ちゃんへ（母子感染）

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

★ **予防措置〔服薬、帝王切開、人工栄養（粉ミルク）での養育〕を行う**

もっと知ってください性感染症（STI）のこと!

STI（Sexually Transmitted Infection）は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。**STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。**また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあり、妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

病名	特徴	症状	
		男性	女性
梅毒（HIV感染との重複が一番多い！）	皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。	感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができる。	
性器クラミジア感染症（最も感染者が多い！）	男女とも感染者が多い。	尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌液が少し出る。	不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。
淋菌感染症（淋病）（男女に拡大）	最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。	尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。	おりものの増加、排尿痛、頻尿。
尖圭コンジローマ	湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。	性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワー状になる。	
性器ヘルペス感染症	女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。	陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをともなう浅い潰瘍となる。	外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をともなう。
トリコモナス症	トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。		膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をともなうおりものやかゆみがある。
B型肝炎（HIV感染との重複が多い！）	感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。	全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。	

（公財）エイズ予防財団「HIV エイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所管理課で受け付けております～