



令和8年度 仙台市 HIV（エイズ）・性感染症検査

最新の検査日程等は仙台市ホームページよりご確認ください、下記お問合せ先にお尋ねください。

青葉区役所 管理課 022-225-7211 内線 6716
 宮城野区役所 管理課 022-291-2111 内線 6719
 若林区役所 管理課 022-282-1111 内線 6728
 太白区役所 管理課 022-247-1111 内線 6715
 泉区役所 管理課 022-372-3111 内線 6716
 感染症対策課 022-214-8029



詳しくはWebで

検査会場		検査日 (原則)	受付 時間	HIV ・梅毒	性器 クラミ ジア	予約・キャンセル方法
有料・ 記名	市内協力医療機関		各診療時間内		○	○ ※医療 機関に よる 予約は2ステップです ① 仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付)し、 予約番号を取得 ② 検査を希望する医療機関に 電話して検査日を予約 【キャンセル方法】 予約をした医療機関へ直接連絡
	※有料(1,000円)・記名の検査です。ご注意ください。 ※協力医療機関や検査方法等、詳しくは 仙台市ホームページよりご確認ください。					
無 ・ 匿名	休日 検査	健康相談所 興生館	第1 土曜日	13:30 ~ 15:00	○ (結果は 約1時 間後)	× 予約方法は2種類です ●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) ●予約専用電話 090-4478-4641 (平日13時~16時) 【キャンセル方法】 電子申請の場合は「申し込み状況確 認ページ」からキャンセル、電話の場 合は検査予約専用電話番号(090- 4478-4641)に電話もしくはショ ートメールで「検査日・予約番号・取 消」と記入し送信
	夜間 検査	●(R8.4月~6月) 健康相談所 興生館 ●(7月~R9.3月) AER(アエル)6F	第2・4 金曜日 (祝日除 く)	17:00 ~ 19:00		
通常 検査	平日 日中 検査	青葉区役所 2F	指定する 火曜日	①9:30 ~ 11:00 ②13:30 ~ 15:00	○ (結果は 後日 再来所)	× 予約方法は2種類です ●各区役所ホームページから 電子申請(24時間受付) ●各検査会場の管理課へ 電話予約(平日のみ受付) 【キャンセル方法】 電子申請の場合は「申し込み状 況確認ページ」からキャンセル、 電話予約の場合は各会場へ電 話
		宮城野区役所 3F	指定する 火曜日	9:00 ~ 10:30		
		若林区役所 3F	指定する 水曜日	9:30 ~ 11:00		
		太白区役所 3F	指定する 火曜日	13:30 ~ 15:30		
		~R8.12月 泉区役所 東庁舎 2階 R9.1月~ 泉区役所 3階	指定する 月曜日	14:00 ~ 15:30		

【予約受付期間】

- ・有料・記名検査(医療機関検査):令和9年3月まで。
- ・無料・匿名検査:原則、検査の2週間前の同じ曜日~検査前日 まで(先着順。キャンセルが出た分は随時受付再開)。
- ※検査当日は、受付の際に予約番号が必要です。予約の際に必ず番号をお控えください。

【注意事項】

- ・「即日検査」は、採血の約1時間後に結果をお伝えしますが、混雑状況により1時間以上かかる場合もございます。
- ・「通常検査」は、結果説明のために後日(概ね1週間後)ご本人に再来所していただきます。
- ・いずれの会場も HIV と梅毒は同時検査であり、どちらか一方のみの検査はできません。
- ・過去に梅毒の治療歴がある場合は、一般的に梅毒即日検査では陽性と判定されます。
- ・その他、注意事項については仙台市ホームページをご確認ください。

HIV/エイズ・ 性感染症の知識

感染を予防する アドバイス

これだけは守りましょう

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

1 性行為 (精液・膣分泌液)

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

性交・オーラルセックス(口腔性交)の際は、必ずコンドームを使う

性器具の共用をしない

2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

★ 注射器具の共用をしない



3 母親から赤ちゃんへ (母子感染)

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

★ 予防措置(服薬、帝王切開、人工栄養(粉ミルク)での養育)を行う

もっと
知ってください
性感染症
(STI)のこと!

STI (Sexually Transmitted Infection) は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあり、妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

病名	特徴	症状	
		男性	女性
梅毒 HIV感染との重複が一番多い!	皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。	感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができる。	
性器クラミジア感染症 最も感染者が多い!	男女とも感染者が多い。	尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌液が少し出る。	不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。
淋菌感染症(淋病) 男女に拡大	最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。	尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。	おりものの増加、排尿痛、頻尿。
尖圭コンジローマ	湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。	性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワー状になる。	
性器ヘルペス感染症	女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。	陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをとまなう浅い潰瘍となる。	外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をとまなう。
トリコモナス症	トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。	膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をとまなうおりものやかゆみがある。	
B型肝炎 HIV感染との重複が多い!	感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。	全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。	

(公財)エイズ予防財団「HIVエイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所管理課で受け付けております～