



令和7年度 仙台市 HIV (エイズ)・性感染症検査

最新の検査日程等は仙台市ホームページよりご確認ください、下記お問合せ先にお尋ねください。

青葉区役所 管理課 022-225-7211 内線 6716
 宮城野区役所 管理課 022-291-2111 内線 6717
 若林区役所 管理課 022-282-1111 内線 6728
 太白区役所 管理課 022-247-1111 内線 6717
 泉区役所 管理課 022-372-3111 内線 6717
 感染症対策課 022-214-8029



詳しくはWebで

検査会場		検査日 (原則)	受付 時間	HIV ・梅毒	性器 クラミ ジア	予約・キャンセル方法
有料・ 記名	市内協力医療機関		各診療時間内		○	○ ※医療 機関に よる 予約は2ステップです ① 仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付)し、 予約番号を取得 ② 検査を希望する医療機関に 電話して検査日を予約 【キャンセル方法】 予約をした医療機関へ直接連絡
	※有料(1,000円)・記名の検査です。ご注意ください。 ※協力医療機関や検査方法等、詳しくは 仙台市ホームページよりご確認ください。					
無料・ 匿名	即日検査	休日検査 健康相談所 興生館	第1 土曜日	13:30 ~ 15:00	○ (結果は 約1時 間後)	× 予約方法は2種類です ●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) ●予約専用電話 090-4478-4641 (平日13時~16時) 【キャンセル方法】 電子申請の場合は「申し込み状況 確認ページ」からキャンセル、場の 場合は検査予約専用電話番号(090- 4478-4641)に電話もしくはショ ートメールで「検査日・予約番号・取 消」と記入し送信
		夜間検査 ●(R7.4月~6月) 健康相談所 興生館 ●(7月~R8.3月) AER(アエル)6F	第2・4 金曜日 (祝日除 く)	17:00 ~ 19:00		
通常検査	平日日 中検査	青葉区役所 2F	指定する 月曜日	14:00 ~ 15:30	○ (結果は 後日 再来所)	× 予約方法は2種類です ●各区役所ホームページから 電子申請(24時間受付) ●各検査会場の管理課へ 電話予約(平日のみ受付) 【キャンセル方法】 電子申請の場合は「申し込み状 況確認ページ」からキャンセル、 電話予約の場合は各会場へ電 話
			指定する 火曜日	9:30 ~ 11:00		
		宮城野区役所 3F	指定する 木曜日	9:00 ~ 10:30		
		若林区役所 3F	指定する 水曜日	9:30 ~ 11:00		
		太白区役所 3F	指定する 火曜日	13:30 ~ 15:30		
		泉区役所東庁舎 2F	指定する 月曜日	14:30 ~ 16:00		

【予約受付期間】

- ・有料・記名検査(医療機関検査): 令和8年3月まで。
- ・無料・匿名検査: 原則、検査の2週間前の同じ曜日~検査前日 まで (先着順。キャンセルが出た分は随時受付再開)。
- ※検査当日は、受付の際に予約番号が必要です。予約の際に必ず番号をお控えください。

【注意事項】

- ・「即日検査」は、採血の約1時間後に結果をお伝えしますが、混雑状況により1時間以上かかる場合もございます。
- ・「通常検査」は、結果説明のために後日(概ね1週間後)ご本人に再来所していただきます。
- ・いずれの会場も HIV と梅毒は同時検査であり、どちらか一方のみの検査はできません。
- ・過去に梅毒の治療歴がある場合は、一般的に梅毒即日検査では陽性と判定されます。
- ・その他、注意事項については仙台市ホームページをご確認ください。

HIV/エイズ・ 性感染症の知識

1 性行為

(精液・膣分泌液)

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

性交・オーラルセックス
(口腔性交)の際は、必ず
コンドームを使う

性器具の共用をしない

もっと
知ってください
性感染症
(STI)のこと!

感染を予防する アドバイス

これだけは守りましょう

2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

注射器具の共用をしない



STI (Sexually Transmitted Infection) は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあり、妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

3 母親から赤ちゃんへ (母子感染)

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

予防措置 [服薬、帝王切開、人工栄養 (粉ミルク) での養育] を行う

病名	特徴	症状	
		男性	女性
梅毒 HIV感染との重複が一番多い!	皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。	感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができる。	
性器クラミジア感染症 最も感染者が多い!	男女とも感染者が多い。	尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌液が少し出る。	不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。
淋菌感染症 (淋病) 男女に拡大	最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。	尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。	おりものの増加、排尿痛、頻尿。
尖圭コンジローマ	湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。	性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワー状になる。	
性器ヘルペス感染症	女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。	陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをとまなう浅い潰瘍となる。	外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をとまなう。
トリコモナス症	トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。	膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をとまなうおりものやかゆみがある。	
B型肝炎 HIV感染との重複が多い!	感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。	全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。	

(公財)エイズ予防財団「HIVエイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所管理課で受け付けております～