



— 匿名・無料 —

仙台市 HIV (エイズ)・性感染症 検査

令和5年10月改訂

新型コロナウイルス感染症等の影響により、検査の実施状況に変更が生じております。
最新の情報は仙台市ホームページよりご確認ください、下記お問合せ先にお尋ねください。

○お問合せ先

青葉区役所 管理課 (代表) 022-225-7211
 宮城野区役所 管理課 (代表) 022-291-2111
 若林区役所 管理課 (代表) 022-282-1111
 太白区役所 管理課 (代表) 022-247-1111
 泉区役所 管理課 (代表) 022-372-3111
 感染症対策室 (代表) 022-214-8029



詳しくはWebで [エイズ検査 仙台市](#)

検査会場		検査日 (原則)	受付 時間	HIV ・梅毒	クラミ ジア	予 約	予約・キャンセル方法
即日検査	休日検査 健康相談所 興生館	第1 土曜日	13:30 ~ 15:00	○ (結果は 約1時 間後)	×	要 予 約	●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) または ●予約専用電話 090-4478-4641 (平日13時~16時) 【キャンセル方法】 検査予約専用電話番号(090- 4478-4641)あてにSMS(ショ ートメール)で「予約検査日・予約番 号(到達番号)・取り消し」と記入し 送信してください。
	夜間検査 ●(R5.4月~6月) 健康相談所 興生館 ●(7月~R6.3月) AER(アエル)6F	第2・4 金曜日 (祝日除く)	17:00 ~ 19:00				
通常検査	青葉区役所 2F 夜間検査	第1または 第2 木曜日	17:30 ~ 19:00	○ (結果は 後日 再来所)	○ (結果は 後日 再来所)	要 予 約	●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) または ●電話予約は各検査会場へ ・青葉区役所 022-225-7211 (管理課 内線 6715) ・宮城野区役所 022-291-2111 (管理課 内線 6719) ・若林区役所 022-282-1111 (管理課 内線 6728) ・太白区役所 022-247-1111 (管理課 内線 6715) 【キャンセル方法】各会場へ TEL
	青葉区役所 2F 日中検査	指定する 月曜日	9:30 ~ 11:00	○ (結果は 後日 再来所)	×		
	宮城野区役所 3F	第3 木曜日 (12月は 第2木曜)	9:00 ~ 10:30				
	若林区役所 3F [R5.11~再開予定]	第2 水曜日	9:00 ~ 10:30				
太白区役所 3F	第3 火曜日	13:30 ~ 15:30					

【予約受付期間】検査の1か月前~検査前日 まで(先着順で定員に到達しだい受付終了。キャンセルが出た分は随時受付再開)。検査当日は、受付の際に予約番号(ネット予約の方は予約メールに書かれた到達番号の下4桁)が必要です。予約の際に必ず番号を控えるか、予約到達メールを保存してください。

【注意事項】

- ・検査日・結果説明日の日程は、ホームページ等でご確認ください。検査会場によって予約・キャンセル先が変わりますのでご注意ください。
- ・「即日検査」は、採血の約1時間後に結果をお伝えしますが、混雑状況により1時間以上かかる場合もございます。
- ・「通常検査」は、結果説明のために後日(概ね1週間後)ご本人に再来所していただきます。
- ・いずれの会場も HIV と梅毒は同時検査であり、どちらか一方のみの検査はできません。
- ・過去に梅毒の治療歴がある場合は、一般的に梅毒即日検査では陽性と判定されます。
- ・クラミジア検査は性器クラミジアの検査です。生理中、妊娠中の方は検査できません。

HIV/エイズ・ 性感染症の知識

1 性行為 (精液・膣分泌液)

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

性交・オーラルセックス(口腔性交)の際は、必ずコンドームを使う

性器具の共用をしない

もっと
知ってください
性感染症
(STI)のこと!

感染を予防する アドバイス

これだけは守りましょう

2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

注射器具の共用をしない



STI(Sexually Transmitted Infection)は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあります。妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

3 母親から赤ちゃんへ (母子感染)

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

予防措置(服薬、帝王切開、人工栄養(粉ミルク)での養育)を行う

病名	特徴	症状	
		男性	女性
梅毒 <i>HIV感染との重複が一番多い!</i>	皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。	感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができる。	
性器クラミジア感染症 <i>最も感染者が多い!</i>	男女とも感染者が多い。	尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌液が少し出る。	不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。
淋菌感染症(淋病) <i>男女に拡大</i>	最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。	尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。	おりものの増加、排尿痛、頻尿。
尖圭コンジローマ	湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。	性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワー状になる。	
性器ヘルペス感染症	女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。	陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをとともう浅い潰瘍となる。	外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をとともう。
トリコモナス症	トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。		膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をとともうおりものやかゆみがある。
B型肝炎 <i>HIV感染との重複が多い!</i>	感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。	全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。	

(公財)エイズ予防財団「HIVエイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所管理課で受け付けております～