



— 匿名・無料 —

仙台市 HIV (エイズ)・性感染症 検査

令和5年4月改訂

新型コロナウイルス感染症等の影響により、検査の実施状況に変更が生じております。

最新の情報は仙台市ホームページよりご確認ください。下記お問合せ先にお尋ねください。

○お問合せ先

青葉区役所 管理課 (代表) 022-225-7211
 宮城野区役所 管理課 (代表) 022-291-2111
 若林区役所 管理課 (代表) 022-282-1111
 太白区役所 管理課 (代表) 022-247-1111
 泉区役所 管理課 (代表) 022-372-3111
 感染症対策室 (代表) 022-214-8029



詳しくはWebで [エイズ検査 仙台市](#) [検索](#)

検査会場		検査日 (原則)	受付 時間	HIV ・梅毒	クラミ ジア	予 約	予約・キャンセル方法
即日検査	休日検査 健康相談所 興生館	第1 土曜日 (5月は 第2土曜)	13:30 ~ 15:00	○ (結果は 約1時 間後)	×	要 予 約	●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) または ●予約専用電話 090-4478-4641 (平日13時~16時) 【キャンセル方法】 検査予約専用電話番号(090- 4478-4641)あてにSMS(ショ ートメール)で「予約検査日・予約番 号(到達番号)・取り消し」と記入し 送信してください。
	夜間検査 ●(R5.4月~6月) 健康相談所 興生館 ●(7月~R6.3月) AER(アエル)6F	第2・4 金曜日 (祝日除く)	17:00 ~ 19:00				
通常検査	青葉区役所 2F 夜間検査	第1または 第2 木曜日	17:30 ~ 19:00	○ (結果は 後日 再来所)	○ (結果は 後日 再来所)	要 予 約	●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) または ●電話予約は各検査会場へ ・青葉区役所 022-225-7211 (管理課 内線 6715) ・宮城野区役所 022-291-2111 (管理課 内線 6719) ・太白区役所 022-247-1111 (管理課 内線 6715) 【キャンセル方法】各会場へ TEL
平日日中検査	青葉区役所 2F 日中検査 【R5.5~再開予定】	指定する 月曜日	9:30 ~ 11:00	○ (結果は 後日 再来所)	×		
	宮城野区役所 3F 【R5.5~再開予定】	第3 木曜日 (12月は 第2木曜)	9:00 ~ 10:30				
	太白区役所 3F 【R5.6~再開予定】	第3 火曜日 (8月は 第4火曜)	13:30 ~ 15:30				

【予約受付期間】検査の1か月前~検査前日 まで(先着順で定員に到達しだい受付終了。キャンセルが出た分は随時受付再開)。検査当日は、受付の際に予約番号(ネット予約の方は予約メールに書かれた到達番号の下4桁)が必要です。予約の際に必ず番号を控えるか、予約到達メールを保存してください。

【注意事項】

- ・検査日・結果説明日の日程は、ホームページ等でご確認ください。検査会場によって予約・キャンセル先が変わりますのでご注意ください。
- ・「即日検査」は、採血の約1時間後に結果をお伝えしますが、混雑状況により1時間以上かかる場合もございます。
- ・「通常検査」は、結果説明のために後日(概ね1週間後)ご本人に再来所していただきます。
- ・いずれの会場も HIV と梅毒は同時検査であり、どちらか一方のみの検査はできません。
- ・過去に梅毒の治療歴がある場合は、一般的に梅毒即日検査では陽性と判定されます。
- ・クラミジア検査は性器クラミジアの検査です。生理中、妊娠中の方は検査できません。

HIV/エイズ・ 性感染症の知識

1 性行為

(精液・膣分泌液)

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

性交・オーラルセックス(口腔性交)の際は、必ずコンドームを使う

性器具の共用をしない

もっと
知ってください
性感染症
(STI)のこと!

感染を予防する アドバイス

これだけは守りましょう

2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

注射器具の共用をしない



STI (Sexually Transmitted Infection) は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあり、妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

3 母親から赤ちゃんへ (母子感染)

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

予防措置(服薬、帝王切開、人工栄養(粉ミルク)での養育)を行う

病名	特徴	症状	
		男性	女性
梅毒 HIV感染との重複が一番多い!	皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。	感染後約3週間で、感染部位に大豆くらい赤くてかたい痛みのないしこりができる。	
性器クラミジア感染症 最も感染者が多い!	男女とも感染者が多い。	尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌液が少し出る。	不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。
淋菌感染症(淋病) 男女に拡大	最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。	尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。	おりものの増加、排尿痛、頻尿。
尖圭コンジローマ	湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。	性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワー状になる。	
性器ヘルペス感染症	女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。	陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをとともう浅い潰瘍となる。	外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をとともう。
トリコモナス症	トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。		膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をとともうおりものやかゆみがある。
B型肝炎 HIV感染との重複が多い!	感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。	全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。	

(公財)エイズ予防財団「HIVエイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所管理課で受け付けております～