

令和7年度 仙台市予防接種実施計画

(令和7年9月1日 改正)


仙台市健康福祉局保健所予防企画課

対象疾病 (ワクチン)	定期接種の対象者	標準的な接種期間	定期接種となる接種間隔等【標準的な接種間隔】	回数	接種量 (方法)
<u>ロタウイルス 感染症</u>					
(【1価:ロタリックス】 経口弱毒生ヒトロタ ウイルスワクチン)	出生6週0日後から 24週0日後までの 間にある者	【両ワクチン共通】 ●初回接種 生後2月に至った日から 出生14週6日後まで	27日以上の間隔を置く	<u>2回</u>	各 1.5ml (経口)
(【5 価:ロタテック】 5 価経口弱毒生ロタ ウイルスワクチン)	出生6週0日後から 32週0日後までの 間にある者		27日以上の間隔を置く	<u>3回</u>	各 2.0ml (経口)
<u>①ジフテリア</u> <u>②百日咳</u> <u>③破傷風</u> <u>④急性灰白髄炎</u> <u>(ポリオ)</u> <u>⑤Hib感染症</u>	【第1期】 生後2月から生後90月 に至るまでの間に ある者	●第1期初回 生後2月に達した時から 生後12月(五種混合のみ7月)に 達するまで	20日以上の間隔を置く 【標準的接種間隔：20日から56日までの間隔を置く】	3回 (※DT の場合 は2回)	●五種混合 各 0.5ml (皮下 または 筋肉内)
(①②③④⑤ …DPT-IPV-Hib) (①②③④…DPT-IPV) (①②③……DPT) (①③……DT) (④……IPV)		●第1期追加 第1期初回接種 (全3回) 終了後12月(五種混合のみ6月) から18月までの間隔を置く	1期初回接種 (3回) 終了後、6月以上の間隔を置く	1回	●五種混合 <u>以外</u> 各 0.5ml (皮下)
<u>ジフテリア</u> <u>破傷風</u> (DT)	【第2期】 11歳以上13歳未満の者	11歳に達した時から12歳に達する まで	-	1回	0.1ml (皮下)


対象疾病	ワクチン	出生時	3か月	6か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	90か月	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	...	60歳	65歳	71歳以上
ロタウイルス感染症	【1価:ロタリックス】 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン																													
	【5価:ロタテック】 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン																													
①ジフテリア ②百日咳 ③破傷風 ④急性灰白髄炎 (ポリオ) ⑤Hib感染症	【1期】 ①②③④⑤ …DPT-IPV-Hib ①②③④…DPT-IPV ①②③……DPT ①③……DT ④……IPV																													
ジフテリア 破傷風	【2期】 DT																													

生後2月から出生14週6日後までの期間を1回目の標準的な接種期間とし、1回目の接種から27日以上の間隔をおいて

生後2月から出生14週6日後までの期間を1回目の標準的な接種期間とし、1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から27日以上の間隔をあけて3回目の接種を行う。
(※出生32週0日後までに3回接種を行う)



20日以上（標準的には20日から56日まで）の間隔をおいて初回接種全3回（※1）を行い、終了後6月以上（※2）の間隔をおいて追加接種（1回）を行う。
※1.D T 使用の場合は初回接種2回
※2.標準的には12月（五種混合は6月）から18月まで



↑：接種 標準的な接種年齢 接種が定められている年齢

対象疾病 (ワクチン)	定期接種の対象者	標準的な接種期間	定期接種となる接種間隔等【標準的な接種間隔】	回数	接種量 (方法)
(単体接種の場合) <u>H i b 感染症</u> (乾燥ヘモフィルス b型ワクチン)	生後2月から生後60月に至る までの間にある者	●初回接種開始は… 生後2月から生後7月 に至るまで	① 初回接種開始時：生後2月～7月に至るまでの間 ●初回接種：27日以上の間隔を置く（※生後12月に至るまでに3回） 【標準的接種間隔：27日（医師が必要と認めるときは20日）から56日まで】 ※ただし、生後12月までに3回の初回接種を完了できない場合でも、生後12月以降に追加接種は可能。この場合の追加接種は、初回接種の終了後、27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔をおいて1回実施する ●追加接種：初回接種終了後7月以上の間隔を置く 【標準的接種間隔：初回接種終了後、7月から13月までの間隔を置く】	初回：3回 追加：1回	各 0.5ml (皮下)
			② 初回接種開始時：生後7月～12月に至るまでの間 ●初回接種：27日以上の間隔を置く（※生後12月に至るまでに2回） 【標準的接種間隔：27日（医師が必要と認めるときは20日）から56日まで】 ※ただし、生後12月までに2回の初回接種を完了できない場合でも、生後12月以降に追加接種は可能。この場合の追加接種は、初回接種の終了後、27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の間隔をおいて1回実施する ●追加接種：初回接種終了後7月以上の間隔を置く 【標準的接種間隔：初回接種終了後、7月から13月までの間隔を置く】	初回：2回 追加：1回	
			③ 初回接種開始時：生後12月に至った日の翌日から60月に至るまでの間	1回	
			① 初回接種開始時：生後2月～7月に至るまでの間 ●初回接種：27日以上の間隔を置く（※生後24月に至るまでに3回） 【標準的接種間隔：生後12月までに27日以上の間隔を置いて3回】 ※ただし、2回目の接種が生後12月を超えた場合、3回目の接種はできない。 なお、この場合でも追加接種は可能 ●追加接種：生後12月に至った日以降、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回	初回：3回 追加：1回	各 0.5ml (皮下 または 筋肉内)
<u>小児の肺炎球菌感染症</u> (沈降15価肺炎球菌 結合型ワクチン) または (沈降20価肺炎球菌 結合型ワクチン)	生後2月から生後60月に至る までの間にある者	●初回接種開始は… 生後2月から生後7月 に至るまで ●追加接種開始は… 生後12月から15月 に至るまで	② 初回接種開始時：生後7月～12月に至るまでの間 ●初回接種：27日以上の間隔を置く（※生後24月に至るまでに2回） 【標準的接種間隔：生後12月までに27日以上の間隔を置いて2回】 ※生後24月を超えた場合、2回目の接種はできないが、追加接種は可能 ●追加接種：生後12月に至った日以降、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回	初回：2回 追加：1回	
			③ 初回接種開始時：生後12月に至った日の翌日から24月に至るまでの間	2回	
			④ 初回接種開始時：生後24月に至った日の翌日から60月に至るまでの間	1回	

対象疾病	ワクチン	出生時	2か月	4か月	7か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	90か月	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	...	60歳	65歳	71歳以上
H i b感染症	乾燥ヘモフィルス b型ワクチン	① 初回接種開始時：生後2月～7月に至るまでの間																27日以上（標準的には27日から56日まで）の間隔において初回接種3回（※初回接種は医師が必要と認めた場合は20日間隔で接種可能） 初回接種後7月以上（標準的には7月から13月まで）の間隔において追加接種1回 ※生後12月を越えた場合は2,3回目は接種せず、初回接種に係る最後の接種後27日以上の間隔において追加接種（1回）の実施は可能 ※この場合の追加接種は医師が必要と認めた場合は20日間隔で接種可能												
		② 初回接種開始時：生後7月～12月に至るまでの間																27日以上（標準的には27日から56日まで）の間隔において初回接種2回（※初回接種は医師が必要と認めた場合は20日間隔で接種可能） 初回接種後7月以上（標準的には7月から13月まで）の間隔において追加接種1回 ※生後12月を越えた場合は2回目は接種せず、初回接種に係る最後の接種後27日以上の間隔において追加接種（1回）の実施は可能 ※この場合の追加接種は医師が必要と認めた場合は20日間隔で接種可能												
		③ 初回接種開始時：生後12月に至った日の翌日から60月に至るまでの																												
小児の肺炎球菌感染症	沈降15価肺炎球菌 結合型ワクチン または 沈降20価肺炎球菌 結合型ワクチン	① 初回接種開始時：生後2月～7月に至るまでの間																標準的には27日以上の間隔で生後12月までに初回接種3回 生後12月から15月を標準的な接種期間として、初回接種後60日間以上の間隔において生後12月以降に追加接種1回 ※生後24月を越えた場合は2,3回目は接種せず、追加接種（1回）は実施可能 ※2回目の接種が生後12月を超えた場合は3回目は接種せず。追加接種1回は実施可能												
		② 初回接種開始時：生後7月～12月に至るまでの間																標準的には27日以上の間隔で生後12月までに初回接種2回 生後12月以降に初回接種後60日間以上の間隔において追加接種1回 生後24月を越えた場合は2回目は接種せず。追加接種1回は実施可能												
		③ 初回接種開始時：生後12月に至った日の翌日から24月に至るまでの																60日以上の間隔で2回												
		④ 初回接種開始時：生後24月に至った日の翌日から60月に至るまでの																												

↑：接種  標準的な接種年齢  接種が定められている年齢

対象疾病 (ワクチン)	定期接種の対象者	標準的な接種期間	定期接種となる接種間隔等【標準的な接種間隔】	回数	接種量 (方法)
<u>B型肝炎</u> (組換え沈降 B型肝炎ワクチン)	1歳に至るまでの間 にある者 (HBs抗原陽性の者の 胎内又は産道において B型肝炎ウイルスに 感染したおそれのある 者であって、抗HBs 人免疫グロブリンの 投与に併せて組換え 沈降B型肝炎ワクチン の投与を受けたこと のある者は 対象外)	生後2月に至った時から生後9月に 至るまで	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、 第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回	3回	各0.25ml (皮下)
<u>結核</u> (BCGワクチン)	1歳に至るまでの間 にある者	生後5月に達した時から生後8月に 達するまで	-	1回	所定の 針 1 本で 滴下 (経皮)
<u>麻しん風しん</u> (MRワクチン または Mワクチン または Rワクチン)	【第1期】 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者		-	1回	各 0.5ml (皮下)
	【第2期】 小学校就学前の1年間にある者 (R7年度対象者：H31.4.2～R2.4.1生)		-	1回	
<u>水痘</u> (乾燥弱毒生 水痘ワクチン)	生後12月から生後36月に 至るまでの間にある者	生後12月から生後15月に達する まで	3月以上の間隔を置く 【標準的接種間隔：6月から12月まで】	2回	各0.5ml (皮下)

対象疾病	ワクチン	出生時	3か月	6か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	90か月	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	…	60歳	65歳	71歳以上
B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン		↑	↑	↑																									
結核	B C G ワクチン			↑																										
麻しん風しん	MRワクチン またはMワクチン またはRワクチン																													
水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン																													

↑：接種



標準的な接種年齢



接種が定められている年齢

生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間とし、27日以上
の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種
する。

標準：生後5月から8月

1期（なるべく早期）


2期：小学校就学前年度4/1～3/31

生後12月から15月に達するまでの期間を1回目の標準的な接種期間とし、3月以上、
標準的には6月から12月までの間隔をおいて2回目の接種を行う。

対象疾病 (ワクチン)	定期接種の対象者	標準的な接種期間	定期接種となる接種間隔等【標準的な接種間隔】	回数	接種量 (方法)
日本脳炎 (乾燥細胞培養日本 脳炎ワクチン)	【第1期初回】 生後6月から生後90月に 至るまでの間にある者	3歳に達した時から4歳に達するまで	6日以上の間隔を置く 【標準的間隔：6日から28日までの間隔を置く】	2回	3歳以上 各0.5ml (皮下)
	【第1期追加】 生後6月から生後90月に 至るまでの間にある者	4歳に達したときから5歳に達するまで	第1期初回終了後、6月以上の間隔を置く 【標準的間隔：1期初回終了後、概ね1年（11月～13月）の間隔を置く】	1回	3歳未満 各0.25ml (皮下)
	【第2期】 9歳以上13歳未満の者	9歳に達した時から10歳に達するまで	-	1回	0.5ml (皮下)
	【特例】 <u>H7.4.2～H19.4.1生の者</u> <u>(※1)で「20歳未満」の者</u>	【特例1】 <u>H23.5.19（※2）までに</u> <u>1回も接種していない者</u>	●第1期初回…6日以上の間隔を置く 【標準的間隔：6日から28日までの間隔を置く】 ●第1期追加…初回2回目まで終了後、 6月 以上の間隔をおいて接種 【標準的間隔：初回2回目まで終了後概ね1年経過した時期】	初回：2回 追加：1回	各0.5ml (皮下)
		【特例2】 <u>H23.5.19（※2）までに</u> <u>1回以上接種している者</u>	●第1期初回…6日以上の間隔を置く 【標準的間隔：6日から28日までの間隔を置く】 ●第1期追加…初回2回目まで終了後、 6日 以上の間隔をおいて接種 【標準的間隔：初回2回目まで終了後概ね1年経過した時期】	残りの回数	0.5ml (皮下)
		【1と2共通】	●第2期…第1期（全3回）終了後、6日以上の間隔を置く	1回	0.5ml (皮下)

※ 1. H17年度からH21年度の積極的勧奨の差控えにより接種機会を逸した者

※ 2. 当該特例の開始日。この日より前、この日以後の接種実績の有無に応じて第1期初回2回目と第1期追加の接種間隔が異なる（R2厚労省確認）






↑

: 接種

標準的な接種年齢

接種が定められている年齢

対象疾病	ワクチン	出生時	...	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳	...	60歳	65歳	71歳以上	
HPV感染症 (子宮頸がん予防)	【サーバリックス】 2価HPVワクチン	対象者：小学6年から高校1年相当年齢の女子（標準接種は中学1年相当年齢の女子）  1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目接種から5月以上かつ2回目接種から2月半以上の間隔をおいて3回目を行う 【標準的には、1回目を0月として以降1ヶ月後に2回目、かつ1回目を0月として6ヶ月後に3回目】																										
	（従来の定期接種） 【 ガーダシル 】 4価HPVワクチン または 【 シルガード9 】 9価HPVワクチン	対象者：小学6年から高校1年相当年齢の女子（標準接種は中学1年相当年齢の女子）  1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目接種から3月以上の間隔をおいて3回目を行う 【標準的には、1回目を0月として以降2ヶ月後に2回目、かつ1回目を0月として6ヶ月後に3回目】 ※シルガード9のみ、1回目を15歳になるまでに接種する場合は2回接種で完了が可能 この場合、5月以上の間隔をおいて2回行う【標準的には1回目を0月として以降6ヶ月後に2回目】																										
（条件付き接種 期間延長 ※令和8年3月まで）	【サーバリックス】 2価HPVワクチン または 【 ガーダシル 】 4価HPVワクチン または 【 シルガード9 】 9価HPVワクチン	対象者：平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子  ※接種回数・接種間隔は従来の定期接種対象者と同じ ※過去の接種実績を確認し、残りの回数を接種																										

↑：接種 ■：標準的な接種年齢 □：接種が定められている年齢

対象疾病 (ワクチン)	定期接種の対象者	定期接種となる接種間隔等【標準的な接種間隔】	自己負担額	回数	接種量 (方法)
帯状疱疹 (乾燥弱毒生水痘 ワクチン)	令和7年度の定期接種対象者 仙台市に住民票があり、下記の①または②のいずれかに該当する者 ①令和7年度中（令和8年3月31日まで）に次の年齢になる者 65歳 ：昭和35年4月2日～昭和36年4月1日生 70歳 ：昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生 75歳 ：昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生 80歳 ：昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生 85歳 ：昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生 90歳 ：昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生 95歳 ：昭和5年4月2日～昭和6年4月1日生 100歳以上：大正15年4月1日以前生 ②接種日時点で60歳から64歳までの者でヒト免疫不全 ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な 程度の障害を有する者	-	5,000円	1回	0.5ml (皮下)
(乾燥組換え帯状疱疹 ワクチン)	※令和7年度の対象者は、令和7年度中に限り定期接種として接種可能。 ※経過措置について 令和7年度から令和11年度の期間は、65歳を越える方の接種機会を 確保するため、65歳～100歳の5歳刻みの年齢に到達する者 (令和7年度は100歳を越える者も含む) が定期接種の対象となります。 なお、経過措置終了後は対象者は以下ようになります。 経過措置終了後（令和12年度以降）の定期接種対象者 以下、①～②のいずれかに該当する者 ①接種日時点で65歳の者 (65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで) ②接種日時点で60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより 免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者	■乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2か月以上の間隔を置く 【標準的接種間隔：2か月以上6か月に至った日の翌日まで】 ※ただし、疾病又は治療により免疫不全である者、免疫機能が 低下した者又は免疫機能が低下する可能性がある者等に ついては、医師が早期の接種が必要と認めた場合、 1か月以上の間隔を置いて2回接種する。 ※これまでに任意接種にて、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを 1回接種した者は、2回目を定期接種として接種できる。	22,000円 (1回あたり 11,000円)	2回	各0.5ml (筋肉内)
任意接種への費用助					
おたふくかぜ (乾燥弱毒生おたふく かぜワクチン)	【費用助成対象年齢】 1歳以上3歳未満	-	2,500円	1回	0.5ml (皮下)

受診券の交付方法・市民への案内方法等 一覧表

受診券の種類	受診券（予診票・個人票）の交付方法			市民への案内・周知時期 等	
	母子手帳別冊（※）内の有無	各区・支所担当窓口での交付	登録医療機関への設置	母子手帳および別冊の交付時	その他
ロタウイルス感染症	○	○	○	○	-
五種混合	○	○	○	○	-
四種混合	-	○	○	○	-
二種混合	-	○	○	-	小学校6年生に学校を通じて通知 登録医療機関へは順次設置予定
H i b 感染症	-	○	○	○	-
小児の肺炎球菌感染症	○	○	○	○	-
B型肝炎	○	○	○	○	-
結核	○	○	○	○	令和7年度より集団接種から個別接種に移行 医療機関ポスター
麻しん風しん（1期）	○	○	○	○	保育施設から対象者に通知
麻しん風しん（2期）	○	○	○	○	保育施設から対象者に通知 就学時健康診断時に学校から通知
水痘	○	○	○	○	-
日本脳炎（1期初回・追加）	○	○	○	○	-
日本脳炎（2期）	-	○	○	-	小学校3年生に学校を通じて通知
HPV感染症	-	○	○	-	令和7年度は小学校6年生、高校1年生へ個別 に通知予定
季節性インフルエンザ*	-	○	○	-	市政だより（毎年10月号予定） 医療機関ポスター
高齢者の肺炎球菌感染症	-	○	○	-	市政だより・医療機関ポスター 当年度中に65歳となる方へ個別に通知予定
带状疱疹	-	○	○	-	市政だより・医療機関ポスター 令和7年度は対象の方へ個別に通知予定
新型コロナウイルス感染症	-	○	○	-	市政だより（毎年10月号予定） 医療機関ポスター
おたふくかぜ	-	○	○	-	1歳6か月児健康診査案内と同時に通知

※母子健康手帳別冊（乳幼児編）：出生者に本市から送付。各予防接種，乳幼児健診等の受診券がつづられている